

## Hvad er autisme

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle autistiske diagnoser.

ASF er inden for kategorien gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som spænder bredt, også over andre diagnoser end ASF.

Mennesker med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotyper, ritualer og/eller særinteresser. Læs om Lorna Wings triade.

Mennesker med ASF kan samtidig have andre handicap/diagnoser. Det kan f.eks. være OCD, Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser mv.

Omkring én procent af befolkningen har ASF. Forekomsten er stigende, hvilket formentlig skyldes øget opmærksomhed og viden på området, men også at mennesker med ASF ofte falder igennem samfundets voksende krav til sociale evner og hurtig omstilling.

## Hvad er autismspektret?

Man bruger ordet autismspektrum, fordi ordet autisme ikke dækker. Der findes flere former for autisme, og det udtrykkes bedst ved at tale om autisme som en spektrumtilstand.

For at mennesket får stillet diagnosen, skal det have vanskeligheder inden for tre områder, som kaldes triaden:



- Afvigelser i forestillingsevnen
- Afvigelser i kommunikationen
- Afvigelser i det sociale samspil

De forskellige diagnoser inden for autismspektret er bl.a.:

- Infantil autisme
- Atypisk autisme
- Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret (GUU)

- Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden (GUA)
- Aspergers syndrom

### **Infantil autisme**

De fleste mennesker med infantil autisme får som regel stillet diagnosen inden treårsalderen. I de fleste tilfælde har de dog vist tegn på tilstanden allerede som helt spæde. Nogle mennesker med infantil autisme har begavelsesmæssige vanskeligheder. Mennesker med infantil autisme har vanskeligheder inden for alle punkter i triaden.

### **Aspergers syndrom**

Mennesker med Aspergers syndrom er normalt begavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder. Deres sproglige udvikling kan dog være anderledes end almindelige mennesker. For eksempel kan de begynde at tale enten meget tidligt eller meget sent, og deres sprog bærer præg af en anderledes måde at udtale sig på.

Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om socialt samspil og forestillingsevnen.

Mennesker med Aspergers syndrom får som regel deres diagnose lidt senere end mennesker med infantil autisme, fordi syndromet som regel først opdages, når de begynder i skolen, hvor der bliver stillet større sociale krav til dem.

Mange med Aspergers syndrom får først diagnosen, når de er blevet voksne, fordi den ikke fandtes, da de var børn. Aspergers syndrom blev først en officiel diagnose i 1992 (1994 i Danmark).

<http://www.autismeforening.dk/autismeForening.aspx?linkId=1>